

PREPARAÇÃO PRÉ - OPERATÓRIA PARA UTENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DO ÂNUS

NA VÉSPERA:

Clister para limpeza intestinal:

- Adquirir o kit para clister na farmácia;
- Montar o kit de clister;
- Colocar cerca de 1 litro de água morna no reservatório;
- Abrir o sistema do kit e deixar escorrer água para preencher todo o tubo;
- Pendurar o depósito de água, pelo menos, a 90 cm do corpo;
- Lubrificar a ponta de plástico com vaselina;
- Adotar a posição de deitado para o lado esquerdo com os joelhos dobrados;
- Introduzir suavemente a ponta de plástico no ânus e abrir o sistema, para permitir a entrada de água no intestino;
- Manter a posição e esperar até sentir uma forte vontade de evacuar entre 2 a 5 minutos;
- Repetir o clister de limpeza até sair água limpa.

AMB.12V2018

PREPARAÇÃO PRÉ - OPERATÓRIA PARA UTENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DO ÂNUS

NA VÉSPERA:

Clister para limpeza intestinal:

- Adquirir o kit para clister na farmácia;
- Montar o kit de clister;
- Colocar cerca de 1 litro de água morna no reservatório;
- Abrir o sistema do kit e deixar escorrer água para preencher todo o tubo;
- Pendurar o depósito de água, pelo menos, a 90 cm do corpo;
- Lubrificar a ponta de plástico com vaselina;
- Adotar a posição de deitado para o lado esquerdo com os joelhos dobrados;
- Introduzir suavemente a ponta de plástico no ânus e abrir o sistema, para permitir a entrada de água no intestino;
- Manter a posição e esperar até sentir uma forte vontade de evacuar entre 2 a 5 minutos;
- Repetir o clister de limpeza até sair água limpa.

AMB.12V2018

PREPARAÇÃO PRÉ - OPERATÓRIA PARA UTENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DO ÂNUS

NA VÉSPERA:

Clister para limpeza intestinal:

- Adquirir o kit para clister na farmácia;
- Montar o kit de clister;
- Colocar cerca de 1 litro de água morna no reservatório;
- Abrir o sistema do kit e deixar escorrer água para preencher todo o tubo;
- Pendurar o depósito de água, pelo menos, a 90 cm do corpo;
- Lubrificar a ponta de plástico com vaselina;
- Adotar a posição de deitado para o lado esquerdo com os joelhos dobrados;
- Introduzir suavemente a ponta de plástico no ânus e abrir o sistema, para permitir a entrada de água no intestino;
- Manter a posição e esperar até sentir uma forte vontade de evacuar entre 2 a 5 minutos;
- Repetir o clister de limpeza até sair água limpa.

AMB.12V2018

AO JANTAR:

Ingerir dieta líquida (água, chá, sumos sem polpa, gelatina, caldo de carne ou peixe).

AO JANTAR:

Ingerir dieta líquida (água, chá, sumos sem polpa, gelatina, caldo de carne ou peixe).

AO JANTAR:

Ingerir dieta líquida (água, chá, sumos sem polpa, gelatina, caldo de carne ou peixe).

NO DIA:

Aplique dois microclisteres (Microlax®) ao acordar.

NO DIA:

Aplique dois microclisteres (Microlax®) ao acordar.

NO DIA:

Aplique dois microclisteres (Microlax®) ao acordar.

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

EM CASO DE DÚVIDA CONTATE:

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.

Unidade de Cirurgia de Ambulatório

Rua Machado Santos, n.º52/54, 2870-351 Montijo

Telefones: 212 309 120 |

212147300 - Extensão 3217 / 3214

E-mail: hmenfuca@chbm.min-saude.pt

www.chbm.min-saude.pt

EM CASO DE DÚVIDA CONTATE:

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.

Unidade de Cirurgia de Ambulatório

Rua Machado Santos, n.º52/54, 2870-351 Montijo

Telefones: 212 309 120 |

212147300 - Extensão 3217 / 3214

E-mail: hmenfuca@chbm.min-saude.pt

www.chbm.min-saude.pt

EM CASO DE DÚVIDA CONTATE:

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.

Unidade de Cirurgia de Ambulatório

Rua Machado Santos, n.º52/54, 2870-351 Montijo

Telefones: 212 309 120 |

212147300 - Extensão 3217 / 3214

E-mail: hmenfuca@chbm.min-saude.pt

www.chbm.min-saude.pt